



СОХРАНИМ УРОЖАЙ ВМЕСТЕ



ГИДРАМАК®

**ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПРОРАСТАНИЕ
ПРИ ХРАНЕНИИ**

Действующее вещество

калиевая соль малеинового гидразида

Концентрация д.в.

800 г/кг

Препаративная форма

водорастворимый порошок

Препарат **Гидрамак®** используется перед уборкой картофеля и луковичных овощных культур для задержки прорастания и улучшения лёжкости клубней и луковиц. Поскольку передвижение действующего вещества в запасующие органы происходит по активным тканям, обработку необходимо проводить до начала физиологического старения культуры.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Продолжительный эффект от применения препарата исключает использование других ингибиторов прорастания во время хранения продукции.
- Предотвращает прорастание клубней картофеля, оставшихся после уборки в поле на следующий год (отменяется дополнительная обработка гербицидами).

ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА



КАРТОФЕЛЬ

- ✓ **ВНИМАНИЕ!** не использовать препарат **Гидрамак®** на посадках семенного картофеля и личных подсобных хозяйствах.
- ✓ Применять препарат **Гидрамак®** в дозе 4,0–5,0 кг/га за 21-25 дней до уборки урожая, обязательно по зеленым листьям, способным поглощать и транспортировать действующее вещество в запасующие органы. Размер 80% сформировавшихся клубней не менее 25 мм. Расход рабочей жидкости - 300 л/га.

ЛУК НА РЕПКУ

Применять препарат **Гидрамак®** в дозе 3,0–4,0 кг/га за 10-14 дней до уборки урожая, обязательно по зеленым листьям, способным поглощать и транспортировать действующее вещество в запасующие органы. Полегание пера должно составлять не более 50%.

Расход рабочей жидкости - 300 л/га.

Срок ожидания 60 дней.

Препарат **Гидрамак®** не применять в стрессовых условиях. Посадки не поливать в течение 24 часов после обработки. Не смешивать с фунгицидами на основе флуазинама, меди и сильнощелочными препаратами.

Приготовление рабочего раствора: необходимое количество препарата растворить в 2/3 от расчетного объема воды, перемешать 2-3 минуты, долить до расчетного объема, проводить обработку. Рабочий раствор израсходовать в день приготовления.

Условия хранения: Препарат хранить в специально предназначенных помещениях, при температуре от -5 °С до +30 °С. После заморозания и оттаивания препарат сохраняет свои свойства.

Срок годности: 3 года с момента изготовления (при невскрытой упаковке).

Препарат проходит государственную регистрацию.

